

cada pé 3 segundos	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []	C [] A [] NA []
Equilibra-se em cada pé 4 segundos						P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []
Equilibra-se em cada pé 5 segundos									P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []	P [] F [] NO [] R [] NA [] C [] A [] NA []
Marcha calcanhar pé												
Equilibra-se em cada pé 6 segundos												
Número de C; A; NO	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =	C= A= NO =
Interpretação	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []	Normal [] Suspeito [] Não Testável []
Conduta	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []	Retestar [] Encaminhamento especialista []

Legenda:

	Linha da idade corta o retângulo antes de 75 %
	Entre 75 e 90% (das crianças nesta idade fazem a ação)
	Já deveria ter feito a ação para a idade

Este formulário será utilizado para registrar as respostas do teste de DENVER utilizando o gráfico.

1º -Traçar a linha da idade no gráfico do DENVER, de acordo com a idade da criança no dia da consulta. Se for prematuro usar a idade corrigida.

- **No gráfico Denver, assinalar:** P = Passou; F = Falha; NO = Não teve oportunidade ; R = Recusou fazer o teste ; C = Cautela (resultados F ou R situados entre o Percentil 75-90% das crianças); A= Atraso (resultados F ou R situados totalmente à esquerda da linha da idade- **nesse caso, pintar a o final do retângulo**)

2º- A coluna a ser marcada será determinada pela idade em meses completos. Marcar a coluna com idade igual ou menor a idade em meses.

Exemplo:

37 meses – crianças de 36 meses e 1 dia a 37 meses

38 meses – crianças de 37 meses e 1 dia a 38 meses

39 meses – crianças de 38 meses e 1 dia a 39 meses

40 meses – crianças de 39 meses e 1 dia a 40 meses

41 meses – crianças de 40 meses e 1 dia a 41 meses

42 meses – crianças de 41 meses e 1 dia a 42 meses

43 meses – crianças de 42 meses e 1 dia a 43 meses

44 meses – crianças de 43 meses e 1 dia a 44 meses

45 meses – crianças de 44 meses e 1 dia a 45 meses

46 meses – crianças de 45 meses e 1 dia a 46 meses

47 meses – crianças de 46 meses e 1 dia a 47 meses

48 meses – crianças de 47 meses e 1 dia a 48 meses

3º - Em cada área de domínio, aplicar todos os itens interceptados pela linha da idade no gráfico do DENVER, e pelos menos três itens totalmente a esquerda e próximos a linha da idade. Se a criança falhar em algum item, adicionar mais itens até que a criança passe 3 itens seguidos.

4º Assinalar: P = Passou; F = Falha; NO = Não teve oportunidade; R = Recusou fazer o teste de acordo com a resposta da criança à administração do item ou NA= não se aplica (caso não tenha sido necessário aplicar o item).

5º Se a Falha tiver ocorrido entre os percentis 75 e 90 assinalar C= Cautela; se a falha tiver ocorrido após o percentil 90 assinalar A=Atraso. Se a criança tiver “Passado”, “Falhado” antes do percentil 75 ou caso não tenha sido necessário aplicar o item assinalar NA= não se aplica.

6º Interpretação: NORMAL (Nenhum ATRASO e no máximo um CAUTELA- Retestar na próxima consulta); **SUSPEITO** (Duas ou mais CAUTELAS e/ou um ou mais ATRASOS - Encaminhar para avaliação especializada); **NÃO TESTÁVEL** (Um ou mais itens classificados como “R” (recusa) localizados totalmente à esquerda da linha da idade ou mais de um localizado entre o Percentil 75%-90%..

OBS : Itens NO não são considerados na interpretação do teste

Observações (especificar a data da observação) _____